



Вакцинация во время беременности

При путешествии в тропические страны, а также в случае эпидемий беременной пациентке рекомендовано проведение вакцинации с применением инактивированных и генно-инженерных вакцин, анатоксинов, оральной полиовакцины.

Беременной пациентке противопоказано назначение живых вакцин. Беременная пациентка

подписывает информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

Инактивированные вакцины против гриппа рекомендуются женщинам, у которых беременность совпадает с сезонной заболеваемостью. Данные основаны на значительном уменьшении распространенности, тяжести течения и последствий гриппа у беременных женщин с потенциальной пользой для рожденных ими младенцев.

Вакцинация во время беременности.

Вакцина	Применение во время беременности	Комментарий
БЦЖ	Нет	
Холера	Нет	Безопасность не доказана
Гепатит А	Да в случае необходимости	Безопасность не доказана
Гепатит В	Да в случае необходимости	
Грипп	Да в случае необходимости	
Японский энцефалит	Нет	Безопасность не доказана
Корь	Нет	
Менингококковая инфекция	Да в случае необходимости	Только в случае высокого риска инфицирования
Эпидемический паротит	Нет	
Оральная вакцина против полиомиелита	Да в случае необходимости	
Инактивированная вакцина против полиомиелита	Да в случае необходимости	Обычно не назначается
Бешенство	Да в случае необходимости	
Краснуха	Нет	
Столбняк/дифтерия/коклюш	Да в случае необходимости	

Тиф	Нет	Безопасность не доказана
Оспа	Нет	
Ветряная оспа	Нет	
Желтая лихорадка	Только в случае высокого риска инфицирования	
Грипп	В сезон гриппа	
COVID-19	Да	С 22 недель беременности